

Zapisz magistralnie proszek niedzielony do stosowania zewnętrznego o działaniu przeciwzapalnym. Skład: kwas salicylowy (*Acidum salicylicum*) st.th. 4%, kwas borny (*Acidum boricum*) st.th. 8%, tlenek cynku (*Zinci oxydum*) oraz talk (*Talcum*) w równych ilościach do 15g. Stosowanie zewnętrznie 4 x dziennie.

Zapisz magistralnie 50 gramów proszku niedzielonego do stosowania zewnętrznego o działaniu osuszającym i przeciwzapalnym. Skład: kwas salicylowy (*Acidum salicylicum*) st.th. 1%, kwas borny (*Acidum boricum*) st.th. 5%, kwas tanninowy (*Acidum tannicum*) st.th. 10%, tlenek cynku (*Zinci oxydum*) st.th. 20%, do wymaganej masy leku uzupełniamy talkiem (*Talcum*). Stosowanie zewnętrznie 2 razy dziennie na miejsca zmienione chorobowo.

Zapisz magistralnie proszki dzielone do użytku wewnętrznego metodą mnożenia oraz dzielenia w maksymalnej liczbie o działaniu uspokajającym oraz rozkurczającym, dla dziecka o masie 20kg. Skład: fenobarbital (*Phenobarbitalum*) stosowany w d.th. 5mg/kg m.c. na dobę oraz chlorowoderek papaweryny (*Papaverini hydrochloridum*) w dawce jednorazowej 40mg dla osoby dorosłej. Stosowanie doustnie 1 proszek 3 razy dziennie.

Zapisz magistralnie proszki dzielone do użytku wewnętrznego metodą mnożenia oraz dzielenia w maksymalnej liczbie o działaniu rozkurczającym. Skład: chlorowoderek papaweryny (*Papaverini hydrochloridum*) jednorazowa dt.th. 40mg, wyciąg suchy z pokrzyki wilczej jagody (*Belladonnae extractum siccum*) jednorazowa dt.th. 10mg, jako podłoża użyj laktozy (*Lactosum*). Stosowanie doustnie 1 proszek w razie bólu.

Zapisz magistralnie maksymalną liczbę czopków o działaniu miejscowym ściągającym i przeciwsłabym dla osoby dorosłej metodą mnożenia oraz dzielenia o działaniu Skład: kwas tanninowy (*Acidum tannicum*) st.th 7% oraz benzokainę (*Benzocainum*) st.th. 10%. Stosowanie doodbytniczo 1 czopek 2 razy dziennie.

Zapisz magistralnie 50 gramów maści z antybiotykiem. Skład: detreomycyna (*Detreomycinum*) st.th. 2%, jako podłoża użyj wazeliny białej (*Vaselinum album*). Stosować zewnętrznie na zmiany skórne 2 razy dziennie.

Zapisz magistralnie maksymalną ilość maści o działaniu przeciwzapalnym. Skład: hydrokortyzon (*Hydrocortisonum*) st.th. 1%, oraz roztwór 3% kwasu bornego (*Solutio Acidum boricum*) st.th. 15%, jako podłoża użyj euceryny (*Eucerinum*). Stosowanie zewnętrznie na miejsca zmienione chorobowo 3 razy dziennie.

Zapisz magistralnie 60 gramów pasty właściwej o działaniu przeciwsłabym. Skład: mentol (*Mentholum*) st.th. 1% oraz benzokaina (*Benzocainum*) st.th. 5%. Jako podłoża użyj wazeliny żółtej (*Vaselini flavum*). Stosować zewnętrznie miejscowo 3 razy dziennie

Zapisz magistralnie 50 gramów mazidła na poparzenia słoneczne. Skład: olej lniany (*Oleum Lini*) oraz woda wapienna (*Aqua calcis*) w równych ilościach. Stosowanie 4 razy dziennie na poparzone miejsca.

Zapisz magistralnie krople do użytku wewnętrznego o działaniu przeciwbólowym oraz rozkurczającym. Skład: Aminofenazon (*Aminophenazonum*) w dawce jednorazowej 300mg oraz chlorowoderek papaweryny (*Papaverini hydrochloridum*) w dawce jednorazowej 40mg. Zapisz tak aby pacjent przyjmował 15 kropli 4 razy dziennie przez 12 dni. Zakładając że 1 g to 20 kropli.

Zapisz magistralnie krople do użytku wewnętrznego o działaniu nasercowym i uspokajającym. Skład: nalewka z kozłka lekarskiego (*Valerianae Tinctura*) d.th. 300mg oraz nalewka z głogu (*Tinctura Crataegi*) d.th. 500mg. Zapisz w ilości aby pacjent przyjmował dawkę terapeutyczną 3 razy dziennie przez 10 dni. Zakładając ze 1g to 50 kropli.

Zapisz magistralnie krople oczne w ilości 5 gramów stosowane w diagnostyce dna oka. Skład: siarczan atropiny (*Atropinum sulfuricum*) st.th. 1%, jako rozpuszczalnika użyj wodę do sporządzania leków do oczu (*Aqua pro usum ophthalmicum*). Stosowanie 1-2 do obu oczu krople 30 minut przed badaniem.

Zapisz magistralnie 30 gramów mieszanki ziołowej o działaniu osłaniającym. Skład: nasiona lnu st.th. 62% (*Lini semen*) oraz korzeń prawoślazu (*Althaeae radix*) st.th. 38%. W sygnaturze opisz domowy sposób sporządzenia maceracji przez pacjenta. Stosowa 3 razy dziennie.

Zapisz magistralnie 60 gramów mieszanki ziołowej o działaniu odkażającym oraz przeciwzapalnym. Skład: koszyczek rumianku (*Anthodium Chamomillae*) oraz liść szalwii (*Folium Salviae*) w równych ilościach. W sygnaturze opisz domowy sposób sporządzenia odwaru przez pacjenta. Stosować 4 razy dziennie ½ szklanki do płukania jamy ustnej.

Zapisz magistralnie 60 gramów pasty miękkiej o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwzapalnym oraz miejscowo znieczulającym. Skład: neomycyna (*Neomycinum*) st.th. 3%, kwas salicylowy (*Acidum salicylicum*) st.th. 10%, benzokaina (*Benzocainum*) st.th. 10%. Stosowanie zewnętrznie, miejscowo 3 razy dziennie.

Zapisz magistralnie 70 gramów zawiesiny do użytku zewnętrznego o działaniu łagodzącym podrażnienia. Skład: tlenek cynku (*Zinci oxydum*) oraz talk (*Talcum*) w równych częściach o stężeniu 40% w ilości 70 gramów masy leku. Jako podłoża użyj oleju rzepakowego (*Oleum Rapae*). Stosować zewnętrznie 2 razy dziennie.

Zapisz magistralnie roztwór o działaniu odkażającym oraz przeciwzapalnym. Skład: 3% roztwór wody utlenionej (*Solutio Hydrogenium Peroxydatum 3%*) 180 gramów, płyn burowa (*Solutio Aluminium Subaceticum*) 30 gramów, woda miętowa (*Aqua menthae piperitae*) 10 gramów. Stosowanie łyżkę stołową na szklankę wody do płukania jamy ustnej.

Zapisz magistralnie 5g maści ocznej stosowaną w zakażeniu nużeńcem. Skład: Metronidazol (*Metronidazolium*) st.th. 4%, kwas borny (*Acidum boricum*) st.th. 4%, siarczan cynku (*Zinci Sulfuricum*) st.th. 0,1%, parafina płynna (*Paraffinum liquidum*) st.th. 40%, jako podłoża użyj wazeliny ocznej (*Vaselinum ophthalmicum*). Stosowanie miejscowo 2 razy dziennie na brzegi powiek.

Zapisz oficjalnie antybiotyk w zawieszynie stosowany u dzieci w zapaleniu ucha zewnętrznego, zawierający połączenie amoksycyliny z kwasem klawulanowym. Dawka terapeutyczna 40mg/kg m.c./dobę w 2 dawkach podzielonych przez 7 dni, pacjent o masie 16kg. Dostępne preparaty Augmentin 457mg/5ml op. a 35ml, 70ml, 140ml. W sygnaturze zapisz pacjentowi szczegółowe dawkowanie.

Zapisz oficjalnie antybiotyk w zawieszynie stosowany u dzieci w zapaleniu oskrzeli, zawierający klarytromycynę. Pacjent o masie 20 kilogramów. Dawka terapeutyczna 15mg/kg m.c./dobę w 2 dawkach podzielonych przez 7 dni. Dostępne preparaty Fromilid 125mg/5ml oraz Fromilid 250mg/5ml op. a 60ml. W sygnaturze zapisz pacjentowi szczegółowe dawkowanie.

Zapisz magistralnie maksymalną ilość czopków metodą mnożenia oraz dzielenia zawierających substancję psychotropową dla dziecka o działaniu przeciwdrgawkowym. Skład: Luminal (*Luminalum*) 15mg, jako podłoża użyj masła kakaowego (Cacao olei). Stosowanie doodbytniczo 1 czopek doraźnie w razie napadu drgawkowego.